

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ГАТИСПАН» В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИППП

Спиридонов В.Е., Клеванович Ю.А., Саларев В.В.

*УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет»*

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

Введение. Лечение инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) и их осложнений имеет ряд трудностей, несмотря на многообразие препаратов. Используются различные схемы лечения и группы препаратов, в том числе фторхинолоны II-IV поколения. Однако ИППП относят к так называемым социопатиям, т.е. заболеваниям, имеющим не только медицинское, но и социальное значение. Поэтому, требования к антимикробным препаратам, применяемым для их лечения, достаточно высоки. Во-первых, неудачи в лечении распространенных социально опасных заболеваний неприемлемы, во-вторых, лечение должно быть эффективным независимо от того, где оно проводится (в областном КВД или районном кожвенкабинете). Необходимо отметить, что лекарственные препараты, использующиеся для лечения ИППП должны отвечать ряду требований как: хорошая переносимость, малая токсичность и низкая вероятность развития резистентности микроорганизмов; возможность перорального приема и возможность применения во время беременности и лактации; доступная цена. Представляется актуальным исследование по оказанию помощи пациентам с ИППП с целью выработки практических рекомендаций по лечению фторхинолонами IV поколения пациентов.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности и переносимости препарата «Гатиспан» (гатифлоксацин) фармацевтической компании «Люпин Лимитед» при лечении больных с хронической формой гонореи у мужчин.

Материалы и методы. Исследование проводилось в Витебском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и включало 46 больных с хронической формой гонореи. Пациенты, имеющие неосложненную уретральную гонорею свежую форму, или те, кто ранее принимал препараты аналогичного действия, в исследование не включались.

В качестве показателя результата лечения использовали динамику болевого синдрома, субъективные ощущения, визуальные и пальпаторные данные местных проявлений болезни на протяжении всего периода приёма препарата. Интенсивность субъективных симптомов (зуд, жжение) оценивалась по следующей шкале: значительная степень выраженности симптомов – 4 балла; средняя степень выраженности – 2 балла; отсутствие симптомов – 0.

Конечная оценка всех субъективных симптомов была произведена по сводному индексу, который представляет собой сумму баллов всех симптомов, разделенную на количество больных. Производился расчет сводного индекса на 1-й и 10-й день.

Клиническая переносимость оценивалась пациентами как хорошая, средняя и плохая. Специальные методы статистического анализа не использовались. Основная группа пациентов состояла из 30-ти больных (16 человек контрольная группа). В основной группе: препарат «Гатиспан» (гatifлоксацин) принимался внутрь по 400 мг 1 раз в сутки, ежедневно – 10 дней в комплексе с иммуностимуляторами: «Тималин» 1 мл (10 мг) 1 раз в сутки, ежедневно в течение 10 дней; капсулы «Антиоксикапс» по 1 кап. 1 раз в сутки, ежедневно 10 дней и средствами местного воздействия с использованием раствора 0,05% «Хлоргексидина биглюконата» в течение 10 дней. В контрольной группе всем пациентам проводилось стандартное лечение по следующей схеме: «Цефтриаксон» по 1 грамму внутримышечно 1 раз в сутки в течение 7 дней; раствор «Тималин» 1 мл (10 мг) 1 раз в сутки, ежедневно в течение 10 дней; местное лечение с использованием антисептиков; физиопроцедуры. Курс лечения для всех больных – 10 дней. Группы были сравнимы по выставленным диагнозам и по оценке течения заболевания.

Результаты и обсуждение: Всего мужчин было 46, средний возраст – 35 лет. Продолжительность заболевания составила от 3 до 5 месяцев. Все пациенты, включенные в исследование имели один или несколько факторов риска: употребление алкоголя, случайные половые связи, ранее перенесенные ИППП и т.д. На момент начала лечения все больные предъявляли жалобы на боли, жжение, зуд в уретральном канале. К 4 суткам от начала приёма препарата «Гатиспан» 73,4% больных отмечали субъективное улучшение в виде уменьшения или исчезновения болевого синдрома, зуда и жжения. В группе с традиционным лечебным комплексом через этот же период были получены соответственно следующие результаты – 43,7%. После оценки результатов на 10-й день от начала лечения была выявлена более высокая эффективность лечения в основной группе с использованием препарата «Гатиспан» в лечении больных с хронической формой гонореи у мужчин. Осложнений, связанных с приёмом препарата «Гатиспан», не отмечено.

Выводы:

- 1 Отмечена высокая эффективность препарата «Гатиспан» при лечении больных с хронической формой гонореи у мужчин.
2. Препарат «Гатиспан» обладает выраженной антибактериальной активностью в отношении гонококков и может быть включен в стандарты терапии ИППП.
3. Препарат хорошо переносится больными и осложнений, связанных с приёмом препарата «Гатиспан», не отмечено.